I-MED PHARMA

I-DROP®
PUR GEL

SÄILÖNTÄAINEETON
VÄLITÖN, PITKÄKESTOINEN KOSTEUTUS
AKTIVOITUU SILMÄN RÄPÄYTYKSESTÄ
0,30 % viskoadaptiivista hyaluronaania

ERINOMAINEN HELPOTUS

FRI FRÅN KONSERVERINGSMEDEL
OMEDELBAR, LÅNGVARIG
ÅTERFUKTNING
BLINKNINGSAKTIVERAD
0,30 % viskoadaptiv hyaluronan

ÖVERLÄGSEN LINDRING

KÄYTTÖAIHEET
Silmien lievän, tuulesta, auringosta, vedestä tai muista ärsykkeistä johtuvan ärsytyksen aiheuttaman epämukavuuden pitkäkestoiseen helpottamiseen. Käytetään voitelu- ja suoja-aineena torjumaan ärsytyksen pahenemista tai lievittämään silmien kuivuutta. I-DROP® PUR GEL on käytettävä 12 kk:n kuluessa avaamisesta. **Älä käytä viimeisen voimassaolopäivän jälkeen (⌛).**

KÄYTTÖOHJEET
Pese kädet ennen käyttöä. Älä käytä viimeisen voimassaolopäivän umpeuduttua. Tiputa yksi tippa ärtyneeseen silmään/silmiin tarpeen mukaan. Katso peiliin ja vedä hellävaraisesti alempi silmäluomi alas ja tiputa yksi tippa luomen sisäpinnalle, tai tiputa yksi tippa suoraan sarveiskalvon alueelle nojaten taaksepäin kasvot ylöspäin. Annostelun jälkeen ravista pois mahdolliset jäämät pullon kärjestä ja kierrä korkki tiukasti kiinni. Säilytä viileässä, kuivassa ja puhtaassa paikassa.

KÄYTTÖVINKKEJÄ
1. Käännä pullo ylösalaisin ja purista varovasti, kunnes pullon kärkeen muodostuu tippa. Tämä voi kestää muutaman sekunnin, sillä liuoksen on kuljettava yksisuuntaisen venttiilijärjestelmän läpi.
2. Kun tippa roikkuu pullon kärjestä, siirrä pullo varovasti silmän ylle ja purista hellävaraisesti, kunnes tippa putoaa ärtyneeseen silmään.
3. Muista: Huomaathan, että käytön jälkeen siniseen kärkeen voi jäädä nestejäämiä. Tämä tarkoittaa, että pullo toimii suunnitellusti, eikä neste imeydy takaisin pulloon.

   Jos pullon kärjessä on käytön jälkeen nestejäämiä, poista ne nopeasti ravistamalla ja sulje korkki tiiviisti.

   Tämä vaihe on kriittinen, jotta pullossa vielä oleva neste pysyisi steriilinä ja turvallisena. Pienenpienikin nestepisara saattaa saastua, kun se altistuu ei-steriilille ympäristölle.

KOOSTUMUS
I-DROP® PUR GEL on steriili, säilöntäaineeton, silmiä räpäyttämällä aktivoituva viskoadaptiivinen voiteleva silmätippa, jonka ainesosat ovat: injektionesteisiin käytettävä vesi, natriumkloridi, natriumhyaluronaatti, glyseriini ja natriumfosfaatti.

VAROITUKSET
Jos koet silmäkipua, näkökyvyn muutoksia, pysyvää silmien punoitusta tai ärtymistä, tai jos tila pahenee tai kestää yli 72 tuntia, lopeta käyttö ja hakeudu lääkärin hoitoon.

I-DROP® PUR GEL saattaa muuttaa muiden silmiisi mahdollisesti käyttämiesi liuosten tai lääkkeiden vaikutusta. Tätä tuotetta ei ole testattu raskaina olevilla tai imettävillä. Älä annostele I-DROP® PUR GEL -tippoja tulehtuneeseen silmään.

Älä käytä koneita tai aja autoa heti käytön jälkeen. Välttääksesi saastumista älä kosketa pullon kärjellä mitään pintaa. Älä käytä tätä tuotetta, jos olet allerginen jollekin sen ainesosista. Sulje korkki käytön jälkeen. Pidä pullo tiiviisti suljettuna. Älä käytä yhdessä piilolinssien kanssa. Älä käytä, jos pullo vaikuttaa vahingoittuneelta tai siltä, että sitä on käytetty väärin.

PIDÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA.

TOIMITUSTAPA
I-DROP® PUR GEL toimitetaan 10 ml:n pullossa. Älä käytä, jos pakkaus on vaurioitunut.

INDIKATIONER
För långvarig lindring av obehag orsakade av lindriga ögonirritationer till följd av exponering för vind, sol, vatten eller andra irriterande ämnen. För användning som ett smörjmedel och skydd mot ytterligare irritation eller för att lindra torrhet i ögonen. I-DROP® PUR GEL är avsedd att användas inom 12 månader efter förpackningen har öppnats. **Använd inte efter sista förbrukningsdatum (⌛).**

INSTRUKTIONER
Tvätta händerna före användning. Använd inte efter sista förbrukningsdatum. Droppa 1 droppe i det eller de drabbade ögonen efter behov. Titta i en spegel och dra försiktigt ned det nedre ögonlocket och droppa 1 droppe inuti eller applicera 1 droppe direkt på hornhinnan genom att luta huvudet bakåt till horisontellt läge. Efter applicering ska du skaka bort eventuella kvarvarande droppar från flaskans spets och sätta tillbaka locket ordentligt. Förvara på ett svalt, rent och torrt ställe.

ANVÄNDNINGSTIPS
1. Vänd flaskan upp och ner och kläm den försiktigt tills det bildas en droppe på spetsen. Det kan ta ett par sekunder eftersom lösningen måste passera genom envägsventilsystemet.
2. Med droppen hängande ut vid öppningen, håll flaskan försiktigt över ögat och kläm försiktigt tills droppen faller ner i det drabbade ögat.
3. Obs! Efter användning kan det finnas rester av vätska kvar på den blå spetsen. Det visar att flaskan fungerar som den ska och inte drar tillbaka vätska in i flaskan.

   Om någon återstående lösning finns kvar på flaskan efter användning, ska du helt enkelt skaka av den snabbt och stänga locket ordentligt.

   Detta steg är viktigt för att kunna hålla lösningen steril och säker. Även en ytterst liten mängd vätska kan kontamineras om den utsätts för en icke-steril omgivning.

SAMMANSÄTTNING
I-DROP® PUR GEL är en steril, konserveringsmedelsfri, blinkningsaktiverad, viskoadaptiv, återfuktande ögondroppe som innehåller: vatten för injektion, natriumklorid, natriumhyaluronat, glycerin, natriumfosfat.

VARNINGAR
Om du upplever smärta i ögonen, synförändringar, fortsatt rodnad eller irritation i ögonen, eller om symptomen förvärras eller kvarstår i mer än 72 timmar ska du sluta att använda produkten och kontakta läkare.

I-DROP® PUR GEL kan påverka effekten av andra ögondroppar eller läkemedel som du eventuellt använder. Produkten har inte testats under graviditet eller amning. Applicera inte I-DROP® PUR GEL i ett infekterat öga.

Använd inte maskiner eller kör fordon direkt efter användning. För att undvika kontaminering ska behållarens spets inte vidröra någon yta. Använd inte denna produkt om du är allergisk mot någon av ingredienserna. Sätt tillbaka locket efter användning. Se till att flaskans lock är ordentligt åtdraget. Får inte användas tillsammans med kontaktlinser. Använd inte om flaskan verkar skadad.

FÖRVARAS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.

FÖRPACKNING
I-DROP® PUR GEL levereras i en flaska med en fyllnadsvolym på 10 ml. Använd den inte om förpackningen är skadad.

2°C 25°C STERILE A CE 2797

SÄILYTÄ 2...25 °C:N LÄMPÖTILASSA.
ÄLÄ KÄYTÄ VIIMEISEN VOIMASSAOLOPÄIVÄN JÄLKEEN (⌛).

I-DROP® on I-MED Pharma Inc:in rekisteröity tavaramerkki.
© 2026 I-MED Pharma Inc.

2°C 25°C STERILE A CE 2797

FÖRVARA MELLAN 2 °C OCH 25 °C.
ANVÄND INTE EFTER SISTA FÖRBRUKNINGSDATUM (⌛).

I-DROP® är ett registrerat varumärke som tillhör I-MED Pharma Inc.
©2026 I-MED Pharma Inc.

Valmistettu Italiassa, valmistuttaja:
Tillverkad i Italien för:
I-MED PHARMA INC.
7190 Frederick Banting Rd.
St. Laurent, QC
Canada H4S 2A1
(514) 685-8118
info@imedpharma.com

EC REP
ARAZY GROUP GmbH The Squaire 12
Am Flughafen, 60549 Frankfurt
am Main Germany

MedEnvoy
Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands

REF: 420
I-DPGELI FI SV Ver.0
imedpharma.com